

INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE RICKETTSIOSIS, SONORA 2022


**Fiebre Manchada por *Rickettsia rickettsii* transmitida
por garrapatas**

Semana Epidemiológica (SE) 31 del 31 de julio al 06 agosto 2022

Informe Epidemiológico Rickettsiosis, México 2022

Casos e incidencia de Fiebre Manchada por *Rickettsia rickettsii* por entidad, México 2022

n=201



A nivel nacional se acumulan a la SE 31

201

casos de rickettsiosis. Sonora ocupa el primer lugar con 92 casos y una incidencia de casos de 2.9^ casos por 100 mil de habitantes

Incidencia nacional: 0.15 casos por 100 mil habitantes

Fuente: * Estados actualizados por SSA/SINAVE/Dirección General de Epidemiología con información a la SE 31 2022

^ Estado de Sonora actualizado por Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector con información a la SE 31 2022

Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2022

En la Semana No. 31 de 2022 se **estudiaron 21 casos sospechosos de FMRR**, de ellos se **confirmaron**

2

Casos

1

Defunciones

Durante el año 2022 se han estudiado **325 casos sospechosos de FMRR**, de ellos se **confirmaron**

92

Casos

42


Defunciones

46%


Letalidad*

- La Fiebre Manchada por *Rickettsia rickettsii* (FMRR) transmitida por garrapatas, es la rickettsiosis de importancia para la salud pública en México y Sonora
- A la misma semana del año 2021 se acumulaban **55 casos y 10 defunciones, letalidad* de 18%**
- Al cierre de 2021 se estudiaron un total de **414 casos probables**, de los cuales **158 se confirmaron**; presentándose **42 defunciones con una letalidad* de 27%**
- Los municipios con más casos en 2021 fueron Hermosillo (78), Cajeme (19), Navojoa (14), Guaymas (13) y Puerto Peñasco (12)

Casos por sexo y grupo de edad**



Casos no fatales y defunciones por derechohabiencia



Distribución de casos por Jurisdicción Sanitaria

JS1 (49)	JS2 (2)	JS3 (5)	JS4 (14)	JS5 (9)	JS6 (13)
53%	2%	6%	16%	10%	13%

Los casos se han presentado en personas de entre los 4 y los 68 años. La mayor incidencia se registró en hombres (53%)

Distribución de casos y defunciones por Municipio, Sonora 2022

Tabla I. Casos y defunciones de FMRR y RGFM por municipio de residencia. Sonora, 2022#

Municipio	FMRR		FGFM		Total		I.A*	Letalidad FMRR [^]	T.M*
	Casos No fatales	Casos fatales	Casos No fatales	Casos fatales	Casos No fatales	Defunciones			
Puerto Peñasco	9	4	0	0	9	4	17.9	30.8	5.5
Hermosillo	27	22	0	0	27	22	5.2	44.9	2.4
Agua Prieta	2	1	0	0	2	1	3.2	33.3	1.1
Magdalena	0	1	0	0	0	1	2.8	100.0	2.8
Navojoa	3	3	0	0	3	3	3.3	50.0	1.6
Huatabampo	1	1	0	0	1	1	2.3	50.0	1.1
Guaymas	1	3	0	0	1	3	2.3	75.0	1.7
Bácum	0	1	0	0	0	1	2.1	100.0	3.9
Caborca	2	0	0	0	2	0	2.1	0.0	0.0
Etchojoa	1	0	0	0	1	0	1.4	0.0	0.0
Cajeme	4	5	0	0	4	5	1.9	55.6	1.0
Nogales	1	0	0	0	1	0	0.4	0.0	0.0
Total	51	41	0	0	51	41	2.9	44.6	1.3

FMRR= Fiebre Manchada por Rickettsia rickettsii. RGFM= Rickettsiosis del Grupo de las Fiebres Manchadas.

*I.A: Incidencia. T.M: Tasa de Mortalidad. Calculo de ambas tasas por 100,000 habitantes.

[^] Letalidad: Defunciones por Fiebre Manchada por Rickettsia rickettsii por cada 100 casos.


Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2022

- Con 92 casos, la incidencia en Sonora es de 2.9 casos por 100 mil habitantes
- **Hermosillo es el municipio con mayor número de casos con 49, de los cuales 22 fueron defunciones, letalidad* de 44.9% y una incidencia de 5.2 casos por 100 mil habitantes**
- **Puerto Peñasco, con 13 casos y 4 defunciones para una letalidad de 30.8%, es el municipio con mayor incidencia con 17.9 casos por 100 mil habitantes, muy por arriba de la media estatal y nacional**

Municipios con incidencia de casos[^]



* Incidencia por 100 000 hab




Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2022

Canal endémico por mes de fiebre manchada rickettsia rickettsi en Sonora, 2022

El canal endémico nos muestra el comportamiento histórico del padecimiento a lo largo del año calendario. La Fiebre Manchada por *Rickettsia rickettsii* se presenta durante todo el año, pero suele tener incrementos en los meses de otoño

Observamos que la incidencia de casos en todo el año 2022 ha permanecido en zona epidémica, muy por arriba de lo esperado

Para considerar a este padecimiento como controlado, su incidencia debería permanecer por debajo de la zona amarilla de la gráfica



MEDIDAS DE PROTECCIÓN RICKETTSIA



Elimina toda la maleza

Las güinas y garrapatas se ocultan en la abundante vegetación



Revisa y baña a tu mascota

De forma periódica, revísalo en su pecho y cuello, detrás de las patas, orejas, alrededor de la cola



Deshazte del escombros

Como colchones viejos, botellas, llantas, ya que la garrapata o güina la utiliza de refugio



Revísate

Diariamente en el cabello, dentro y detrás de orejas, obliquo, en medio de tus dedos (mano y pie), detrás de las rodillas



Limpia tu entorno

Frecuentemente por dentro y por fuera; tapa todo hoyo en paredes, para evitar formación de nidos de güina o garrapatas



Directorio

Dr. José Luis Alomía Zegarra
Secretario de Salud

Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi
Subsecretaria de Salud

Dr. Jorge Laureano Eugenio
Director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades (DGPROSPE)

Dr. Universo Ortiz Arballo
Director de Epidemiología

Lic. Dulce María Cárdenas López
Coordinadora de la Unidad Detectora de Urgencias Epidemiológicas (UDUE)

Lic. Esther María Félix Arce
Responsable del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Rickettsiosis