


INFORME EPIDEMIOLÓGICO SEMANAL DE RICKETTSIOSIS, SONORA 2023

Fiebre Manchada por *Rickettsia Rickettsii* transmitida por garrapatas

Semana Epidemiológica (SE) 36, del 03 al 09 de septiembre 2023

Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2023

Casos confirmados e incidencia de Rickettsiosis por entidad, SE 35. México 2023



A nivel nacional a la SE 35 se acumulan

300

casos de Rickettsiosis. Para esta semana, Sonora acumula 77 casos y una incidencia de 2.4[^] casos por 100 mil de habitantes.

Incidencia nacional: 0.2[^] casos por 100 mil habitantes.

Fuente: * Estados actualizados por SSA/SINAVE/Dirección General de Epidemiología con información a la SE 35 2023.

^ Estado de Sonora actualizado por Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector con información a la SE 35 2023.

Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2023

En la Semana No. 36 de 2023 se estudiaron 48 casos sospechosos de FMRR, de ellos se confirmaron

2

Casos*

1

Defunciones**

Durante el año 2023 se estudiaron 614 casos sospechosos de FMRR, de ellos se confirmaron

81

Casos

45


Defunciones

(Letalidad: 56%)^

- La Fiebre Manchada por *Rickettsia Rickettsii* (FMRR) transmitida por garrapatas, es la rickettsiosis de mayor importancia para la salud pública en México y Sonora.
- A la misma semana del año 2022 se acumulaban 117 casos y 54 defunciones; por lo que en 2023 se registra una reducción de -31% en casos y -17% en defunciones
- Al cierre de 2022 se estudiaron un total de 757 casos sospechosos, de los cuales 190 se confirmaron; presentándose 97 defunciones con una letalidad^ del 51%.

Defunciones por FMRR, Sonora 2023

A la Semana No. 36 de 2023 se han presentado 45 defunciones




Las defunciones sucedieron en los municipios de Hermosillo (31), Cajeme (4), Etchojoa, Empalme y Puerto Peñasco (2 cada uno); Magdalena, Guaymas, Huatabampo y Navojoa (1 cada uno); de los cuales 35 no presentan comorbilidades y el resto (10) presentaba diabetes, Inmunosupresión, hipertensión y otros como comorbilidad.

Grupos de edad	Defunciones	T.M
0 a 4 años	1	0.4
5 a 9 años	4	1.6
10 a 14 años	4	1.5
15 a 19 años	6	2.2
25 a 29 años	3	1.2
30 a 34 años	3	1.2
35 a 39 años	2	0.9
40 a 44 años	2	0.9
45 a 49 años	2	1.0
50 a 54 años	4	2.2
55 a 59 años	5	3.2
60 a 64 años	4	3.1
65 y más	5	1.9
Total	45	1.4


La edad promedio de los casos fallecidos es de 37 años

Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2023

Casos por sexo y grupo de edad**



Casos no fatales y defunciones por derechohabiencia



Distribución de casos por Distritos de Salud*

DS 01 (53)	DS 02 (0)	DS 03 (1)	DS 04 (10)	DS 05 (9)	DS 06 (8)
66%	0%	1%	12%	11%	10%

Los casos de la semana se presentaron de 12 a 65 años de edad

Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Rickettsiosis con información a la SE 36 2023.

** Casos por Rickettsia Rickettsii.

Casos y defunciones por Municipio, Sonora 2023


Casos y defunciones de FMRR por municipio de residencia Sonora, 2023

Municipio	FMRR			IA *	Letalidad FMRR [^]	T.M*
	Casos No fatales	Casos fatales	Total			
Puerto Peñasco	6	2	8	10.6	25.0	2.6
Hermosillo	22	31	53	5.4	58.5	3.2
Empalme	1	2	3	4.8	66.7	3.2
Álamos	1	0	1	3.5	0.0	0.0
Etchojoa	0	2	2	2.9	100.0	2.9
Magdalena	0	1	1	2.8	100.0	2.8
Navojoa	4	1	5	2.7	20.0	0.5
Cajeme	2	4	6	1.2	66.7	0.8
Huatabampo	0	1	1	1.1	100.0	1.1
Guaymas	0	1	1	0.6	100.0	0.6
Total	35	45	81	2.5	55.6	1.4

FMRR= Fiebre Manchada por *Rickettsia rickettsii*.

*I.A: Incidencia. T.M: Tasa de Mortalidad. Cálculo de ambas tasas por 100 000 habitantes.

*^ Letalidad: Defunciones por Fiebre Manchada por *Rickettsia rickettsii* por cada 100 casos.




Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2023

El canal endémico nos muestra el comportamiento histórico del padecimiento a lo largo del año calendario. La FMRR suele tener incremento en otoño.

Observamos que la incidencia ha disminuido en los últimos dos meses, sin embargo, el mes de agosto 2023 se posiciona en "Zona de Seguridad"

Para considerar a este padecimiento como controlado, su incidencia debería permanecer por debajo de la zona de seguridad.



Medidas de Promoción Rickettsia



Elimina toda la maleza

Las güinas y garrapatas se ocultan en la abundante vegetación



Revisa y baña a tu mascota

De forma periódica, revísalo en su pecho y cuello, detrás de las patas, orejas, alrededor de la cola



Deshazte del escombros

Como colchones viejos, botellas, llantas, ya que la garrapata o güina la utiliza de refugio



Revísate

Diariamente en el cabello, dentro y detrás de orejas, ombligo, en medio de tus dedos (mano y pie), detrás de las rodillas



Limpia tu entorno

Frecuentemente por dentro y por fuera; tapa todo hoyo en paredes, para evitar formación de nidos de güinas o garrapatas



Directorio

Dr. José Luis Alomía Zegarra
Secretario de Salud Pública

Dr. Jorge Laureano Eugenio
Director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades

Dr. Universo Ortiz Arballo
Director de Epidemiología

Dr. Víctor Abel Coronado Félix
Subdirector de Vigilancia Epidemiológica

QBC. Jesús Manuel Contreras García
Responsable del Sistema Especial de Enfermedades Transmitidas por Vector