

Informe Epidemiológico Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna Sonora, 2022

Semana epidemiológica 44:

Periodo comprendido del 30 de octubre al 05 de noviembre de 2022

Definiciones

Clasificación según el momento de la defunción:

Muerte Materna (MM)

La que ocurre durante el embarazo o hasta 42 días después, independientemente de la duración y el sitio del embarazo; por causas relacionadas con o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales ni incidentales.

Muerte Materna Tardía

La muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días, pero antes de 1 año de la terminación del embarazo.

Clasificación según la causa de defunción:

Defunción Obstetrica Directa

La resultante de complicaciones obstétricas del embarazo, parto o puerperio; intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto, o de acontecimientos derivados de las circunstancias mencionadas.

Defunción Obstetrica Indirecta

La resultante de una enfermedad existente desde antes del embarazo, o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo; no debidas a causas obstétricas directas, pero si agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.


Informe Epidemiológico MM, Sonora 2022

A la semana 44, a nivel nacional se acumulan:

**543
MM**

Sonora se encuentra en la posición 17º en volumen de MM y 16º en RMM


Muertes maternas y Razón de Mortalidad Materna (RMM) en México, por entidad federativa. A la semana 44, 2022



Lugar nacional: Posición que ocupa Sonora respecto a las 32 entidades federativas del país. La posición 1º corresponde a la entidad con mayor ocurrencia y/o riesgo de muerte materna, mientras que el 32º se refiere a la de menor volumen y riesgo.
* Fuente: SS, SPPS, DGE. Informe semanal de notificación inmediata de muerte materna. Semana epidemiológica 44 de 2022.


Comportamiento histórico estatal y nacional

Muertes maternas para la RMM en Sonora a la semana 44, 2017 - 2022



■ MM para la RMM a la SE 44 - - - - - Tendencia

RMM en Sonora y México. Informe semanal DGE, 2008 - 2022~



● RMM Nacional

* Cifras preliminares al cierre oficial
~ A la semana 44

RMM: Razón de Mortalidad Materna

* Cifras preliminares al cierre oficial

~ A la semana 44 de 2022

Fuentes:

SS. SPPS. DGE. Informe semanal de notificación inmediata de muerte materna.

SSS. DGPROSPE.DIAE. Sistema de vigilancia epidemiológica de notificación inmediata de muertes maternas. A la semana epidemiológica 44 de 2022

Informe Epidemiológico MM*, Sonora 2022

En la Semana No. 44 de 2022
se notificó

1[~]

MM para la razón RMM

Durante el año 2022
se acumulan

13

MM

- A la misma semana del año 2021 se acumulaban **19 muertes maternas para la RMM[^]**
- Al cierre de 2021 se confirmaron **23 MM**
- Los municipios que presentaron MM en 2021 fueron: Hermosillo (5), Cajeme (5), Guaymas (3), Puerto Peñasco, Magdalena y San Luis Río Colorado (2 cada uno); San Miguel de Horcasitas, Agua Prieta, Álamos y Nogales (1 cada uno)

* MM: Muerte materna en residentes del estado, para la Razón de Mortalidad Materna.

[~] Ocurrió en residente del municipio de Etchojoa

[^] RMM: Razón de Mortalidad Materna

Fuente: SSS. DGPROSPE.DIAE. Sistema de vigilancia epidemiológica de notificación inmediata de muertes maternas. A la semana epidemiológica 44 de 2022

Momento de la defunción de MM, 2022

- 2** durante el embarazo (10 SDG)
- 1** durante el parto (35 SDG)
- 0** en las primeras 24 horas posteriores a su evento obstétrico
- 6** entre el 2° y el 10° día posterior a su evento obstétrico
- 4** entre el 11° y 42° día posterior a su evento obstétrico

Causas de mortalidad de MM, 2022

Durante el embarazo o parto:

23% (3)

Por causa directa: 1

Eclampsia

Por causa indirecta: 2

Fiebre manchada por *Rickettsia Rickettsii*
Influenza

Durante el puerperio:

77% (10)

Por causa directa: 3

Síndrome de Hellp
Sepsis puerperal
Desprendimiento de placenta

Por causa indirecta: 7

No infecciosa (3)


Asma bronquial
Insuficiencia cardíaca congénita
Purpura Trombocitopénica Idiopática

Infecciosa (4)

Tuberculosis pulmonar
Necrólisis epidérmica tóxica
Dengue (2)


Informe Epidemiológico MM, Sonora 2022

RMM por grupo de edad en Sonora, 2021 - 2022



Cifras preliminares al cierre oficial de mortalidad y SINAC, sujetas a actualizaciones.

MM por derechohabiencia



La mediana de edad es de 27 años [RIQ 21-31].
Los casos oscilan entre los 19 y 37 años.

Informe Epidemiológico MM, Sonora 2022


Distribución de MM por municipio de residencia

Municipio	Volumen de MM	RMM
Yécora	1	1158.2
Benito Juárez	1	300.0
Álamos	1	262.9
Navojoa	3	123.8
Etchojoa	2	215.9
Agua Prieta	1	79.0
Cajeme	2	31.7
Hermosillo	2	16.1

Distribución de MM por Distrito de Salud

DS 01	DS 02	DS 03	DS 04	DS 05	DS 06
2	0	1	3	7	0

Razón de Mortalidad Materna



Recomendaciones

Durante el embarazo:

- Ingiera alimentos ricos en calcio, hierro y ácido fólico
- Evita el ejercicio intenso
- No cargues cosas pesadas
- No fumes, bebas alcohol u otras drogas
- Mantén tu higiene personal y usa ropa cómoda
- Acude a valoración prenatal, como mínimo 5 consultas
- Elabora un plan de seguridad para la atención del parto, toma en cuenta: la fecha estimada del nacimiento de tu bebé, el médico que atenderá el parto, las personas que pueden acompañarte y quien te apoyará en el cuidado de tus otros hijos



Durante el puerperio:

- Continúa la suplementación de ácido fólico (0.4 mg/día)
- Lleva una dieta balanceada
- Vigila el sangrado vaginal
- En este periodo es normal que puedas sentir tristeza, se trata de una etapa transitoria llamada “depresión puerperal”. Si este estado de ánimo dificulta tu vida diaria, coméntalo con tu médico.
- Recuerda: después del nacimiento de tu bebé debes acudir a 2 consultas médicas: en los primeros 15 días y al final de tu cuarentena.

Para más información o quejas:



800 M A T E R N A
800 6 2 8 3 7 6 2

Señales de alarma

Durante el embarazo:

- Si te duele la cabeza
- Si escuchas zumbidos
- Si te mareas
- Si ves lucecitas o borroso
- Si tienes calentura o escalofríos
- Si tienes sangrado o líquido vaginal
- Si el bebé no se mueve
- Si tu trabajo de parto se tarda más de 12 horas
- Si tienes ataques o convulsiones
- Si tienes contracciones antes de la fecha probable de parto
- Si tienes molestia o dolor al orinar y/u orinas sangre



Durante el puerperio:

- Dolor de cabeza constante
- Hinchazón de manos, cara piernas y pies
- Ver lucecitas o borroso
- Escuchar zumbidos
- Sangrado vaginal mayor a la menstruación o con mal olor
- Dolor abdominal intenso, como un "cinturón que aprieta"
- Secreción por la herida operatoria y/o enrojecimiento, en caso de cesárea
- Molestias o dolor al orinar



Si presentas señales de alarma, acude de inmediato a tu unidad de salud para recibir atención médica

Secretario de Salud Pública

Dr. José Luis Alomía Zegarra

Subsecretaria de Servicios de Salud

Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

Director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades

Dr. Jorge Laureano Eugenio

Directora de Información y Análisis Epidemiológico

Dra. Tanya Rocío Llanes López

Coordinadora de Sistemas de Información Epidemiológica

Dra. María de Jesús Nevares García

Responsable Estatal del Sistema de Notificación Inmediata de Muerte Materna

Lic. Enf. Carmen Aurora Gil Soto