

Informe Epidemiológico Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna Sonora, 2023

Semana Epidemiológica (SE) 50, del 10 al 16 de diciembre 2023

Definiciones

Clasificación según el momento de la defunción:

Muerte Materna (MM)

La que ocurre durante el embarazo o hasta 42 días después, independientemente de la duración y el sitio del embarazo; por causas relacionadas con o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales ni incidentales.

Muerte Materna Tardía

La muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días, pero antes de 1 año de la terminación del embarazo.

Clasificación según la causa de defunción:

Defunción Obstétrica Directa

La resultante de complicaciones obstétricas del embarazo, parto o puerperio; intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto, o de acontecimientos derivados de las circunstancias mencionadas.

Defunción Obstétrica Indirecta

La resultante de una enfermedad existente desde antes del embarazo, o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo; no debidas a causas obstétricas directas, pero si agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.


Informe Epidemiológico MM, Sonora 2023

A la semana 50, a nivel nacional se acumulan:

**534
MM**


Sonora se encuentra en la posición 19 en volumen de MM y 22 RMM

Muertes maternas y Razón de Mortalidad Materna (RMM) en México, por entidad federativa. A la semana 50, 2023




Comportamiento histórico estatal y nacional

Muertes maternas acumuladas según el tipo de muerte. Sonora, 2017 - 2023~



■ MM para RMM ▨ Tardías ■ Residentes de otros estados

RMM en Sonora y México. Informe semanal DGE, 2008 - 2023~



* Cifras preliminares al cierre oficial
~ A la semana 50

Informe Epidemiológico MM, Sonora 2023

En la Semana 50 de 2023
se notificó

0

MM

Durante el año 2023
se acumulan

17

MM

- A la misma semana del año 2022 se acumulaban **13 muertes maternas para la RMM[^]**.
- Al cierre de 2022 se confirmaron 14 MM.
- Los municipios que presentaron MM en 2022 fueron: Navojoa y Cajeme (3 cada uno); Etchojoa (2), Agua Prieta, Álamos, Bacanora, Hermosillo, Yécora y Benito Juárez (1 cada uno).
- A la semana epidemiológica 50 de 2023 se acumulan 10 para la **RMM**, distribuidas por municipio de residencia en: Hermosillo (2), Benito Juárez, Cajeme, Caborca, Huatabampo, San Ignacio Río Muerto, Etchojoa, Magdalena, y Yécora (1 cada uno); 5 MM tardías en Guaymas (2), Nogales, Cajeme y Hermosillo (1 cada uno); y que corresponden a otro estado (2 BCS).

Momento de la defunción de MM, 2023

- 3** durante el embarazo (SDG)
- 0** durante el parto (SDG)
- 4** en las primeras 24 horas posteriores a su evento obstétrico
- 2** entre el 2° y el 10° día posterior a su evento obstétrico
- 3** entre el 11° y 42° día posterior a su evento obstétrico
- 5** después de los 42 días, pero antes de 1 año de la terminación del embarazo.

Causas de mortalidad de MM, 2023

Durante el embarazo o parto: 2

11.7% (2)

Por causas indirectas no infecciosas: 1
Coriocarcinoma

Por causas indirectas infecciosas: 1
Neumonía atípica

Durante el puerperio: 8

47.0% (8)

Por causas directas: 5
Choque hipovolémico (2)
Eclampsia
Enfermedad pélvica inflamatoria
Sepsis puerperal

Por causas indirectas no infecciosas: 2
Hemorragia subaracnoidea
Trastornos del hígado en el embarazo, parto y puerperio

Causas indirectas infecciosas: 1
Neumonía atípica

MM tardía: 5

29.4% (5)

Muertes maternas tardías: 5
Crisis lúpica
Neumonía
Coccidiomicosis diseminada
Tromboembolia pulmonar
Enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central

Otro estado: 2


11.7% (2)

Baja California Sur: 2
Tromboembolia pulmonar
Preeclampsia

Informe Epidemiológico MM, Sonora 2023

RMM por grupo de edad en Sonora, 2022 - 2023


RMM por grupo de edad en Sonora, 2022 - 2023. (*A la semana 50)



Cifras preliminares al cierre oficial de mortalidad y SINAC, sujetas a actualizaciones.

RMM por derechohabiencia

Distribución de MM por derechohabiencia. Sonora, 2023



* Las MM tardías no entran en la estadística para RMM

La mediana de edad es de 28 años
Los casos oscilan entre los 19 y 33 años

Informe Epidemiológico MM, Sonora 2023

Distribución de MM por municipio de residencia

Municipio	Volumen de MM	RMM
Benito Juárez	1	264.8
Caborca	1	67.5
Cajeme	1	14
Etchojoa	1	95.3
Hermosillo	2	14.2
Huatabampo	1	74.4
Magdalena	1	184.8
San Ignacio Río Muerto	1	413.9
Yécora	1	1023.1
MM Tardías		
Cajeme	1	-
Guaymas	2	-
Hermosillo	1	-
Nogales	1	-

Distribución de MM por Distrito de Salud

DS 01	DS 02	DS 03	DS 04	DS 05	DS 06
3	1	2	6	3	0
20%	6.6%	13.4%	40%	20%	0%

Residentes de otros Estados

Baja California Sur	2	-
---------------------	---	---

Recomendaciones

Durante el embarazo:

- Ingiera alimentos ricos en calcio, hierro y ácido fólico.
- Evita el ejercicio intenso.
- No cargues cosas pesadas.
- No fumes, bebas alcohol u otras drogas.
- Mantén tu higiene personal y usa ropa cómoda.
- Acude a valoración prenatal, como mínimo 5 consultas.
- Elabora un plan de seguridad para la atención del parto, toma en cuenta: la fecha estimada del nacimiento de tu bebé, el médico que atenderá el parto, las personas que pueden acompañarte y quien te apoyará en el cuidado de tus otros hijos.



Durante el puerperio:

- Continúa la suplementación de ácido fólico (0.4 mg/día).
- Lleva una dieta balanceada.
- Vigila el sangrado vaginal.
- En este periodo es normal que puedas sentir tristeza, se trata de una etapa transitoria llamada “depresión puerperal”. Si este estado de ánimo dificulta tu vida diaria, coméntalo con tu médico.
- Recuerda: después del nacimiento de tu bebé debes acudir a 2 consultas médicas: en los primeros 15 días y al final de tu cuarentena.

Para más información o quejas:




800 M A T E R N A
800 6 2 8 3 7 6 2

Señales de alarma

Durante el embarazo:

- Si te duele la cabeza.
- Si escuchas zumbidos.
- Si te mareas.
- Si ves lucecitas o borroso.
- Si tienes calentura o escalofríos.
- Si tienes sangrado o líquido vaginal.
- Si el bebé no se mueve.
- Si tu trabajo de parto se tarda más de 12 horas.
- Si tienes ataques o convulsiones.
- Si tienes contracciones antes de la fecha probable de parto.
- Si tienes molestia o dolor al orinar y/u orinas sangre.



Durante el puerperio:

- Dolor de cabeza constante.
- Hinchazón de manos, cara piernas y pies.
- Ver lucecitas o borroso.
- Escuchar zumbidos.
- Sangrado vaginal mayor a la menstruación o con mal olor.
- Dolor abdominal intenso, como un "cinturón que aprieta".
- Secreción por la herida operatoria y/o enrojecimiento, en caso de cesárea.
- Molestias o dolor al orinar.



Si presentas señales de alarma, acude de inmediato a tu unidad de salud para recibir atención médica

Directorio

Dr. José Luis Alomía Zegarra
Secretario de Salud

Dr. Jorge Laureano Eugenio
Director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades

Dra. María de Jesús Nevares García
Directora de Información y Análisis Epidemiológico

Dra. Elizabeth Solís Hernández
Coordinadora Estatal de Información Epidemiológica

Dra. Nínive Adahia Ortega Burgoin
Responsable Estatal de Vigilancia Epidemiológica de Mortalidad Materna