



Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades Dirección de Información y Análisis Epidemiológico

Informe Epidemiológico Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna Sonora, 2023

Semana epidemiológica 01:

Periodo comprendido del 01 al 07 de enero de 2023





Definiciones

Subsecretaría de Servicios de Salud Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades Dirección de Información y Análisis Epidemiológico

Clasificación según el momento de la defunción:

Muerte Materna (MM)

La que ocurre durante el embarazo o hasta 42 días después, independientemente de la duración y el sitio del embarazo; por causas relacionadas con o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales ni incidentales.

Muerte Materna Tardía

La muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días, pero antes de 1 año de la terminación del embarazo.

Clasificación según la causa de defunción:

Defunción Obstétrica Directa

La resultante de complicaciones obstétricas del embarazo, parto o puerperio; intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto, o de acontecimientos derivados de las circunstancias mencionadas.

Defunción Obstétrica Indirecta

La resultante de una enfermedad existente desde antes del embarazo, o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo; no debidas a causas obstétricas directas, pero si agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.






Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades Dirección de Información y Análisis Epidemiológico

Informe Epidemiológico MM, Nacional 2023

A la semana 1, a nivel nacional se acumulan:

5 **MM**


Sonora no cucenta muertes maternas




Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades Dirección de Información y Análisis Epidemiológico

Comportamiento histórico estatal y nacional

Muertes maternas para la RMM en Sonora a la semana 1, 2017 - 2023







* Cifras preliminares al cierre oficial

~ A la semana 1

RMM: Razón de Mortalidad Materna * Cifras preliminares al cierre oficial

~ A la semana 1 de 2023

uentes:

SS. SPPS. DGE. Informe semanal de notificación inmediata de muerte materna.








Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades Dirección de Información y Análisis Epidemiológico

Informe Epidemiológico MM*, Sonora 2023



A la misma semana del año 2022 se acumulaban 2 muertes maternas para RMM^

- Al cierre** de 2022 se confirmaron 14 MM
- Los municipios que presentaron MM en 2022 fueron: Navojoa y Cajeme (3 cada uno); Etchojoa (2); Agua Prieta, Álamos, Bacanora, Hermosillo, Yécora y Benito Juárez (1 cada uno)







Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades Dirección de Información y Análisis Epidemiológico

Momento de la defunción de MM, 2023

- durante el embarazo (SDG)
- **O** durante el parto (SDG)
- en las primeras 24 horas posteriores a su evento obstétrico
- entre el 2° y el 10° día posterior a su evento obstétrico
- entre el 11º y 42º día posterior a su evento obstétrico

Causas de mortalidad

Durante el embarazo o parto:

0% (0)

Durante el puerperio:

0% (0)







Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades Dirección de Información y Análisis Epidemiológico

Recomendaciones

 Ingiere alimentos ricos en calcio, hierro y ácido fólico

Durante el embarazo:

- Evita el ejercicio intenso
- No cargues cosas pesadas
- No fumes, bebas alcohol u otras drogas
- Mantén tu higiene personal y usa ropa cómoda
- Acude a valoración prenatal, como mínimo 5 consultas
- Elabora un plan de seguridad para la atención del parto, toma en cuenta: la fecha estimada del nacimiento de tu bebé, el médico que atenderá el parto, las personas que pueden acompañarte y quien te apoyará en el cuidado de tus otros hijos



Durante el puerperio:

- Continua la suplementación de acido fólico (0.4 mg/día)
- Lleva una dieta balanceada
- Vigila el sangrado vaginal
- En este periodo es normal que puedas sentir tristeza, se trata de una etapa transitoria llamada "depresión puerperal". Si este estado de ánimo dificulta tu vida diaria, coméntalo con tu médico.
- Recuerda: después del nacimiento de tu bebé debes acudir a 2 consultas médicas: en los primeros 15 días y al final de tu cuarentena.

Para más información o quejas: 800 M A T E R N A 800 6 2 8 3 7 6 2






Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades Dirección de Información y Análisis Epidemiológico

Señales de alarma

Durante el embarazo:

- Si te duele la cabeza
- Si escuchas zumbidos.
- Si te mareas
- Si ves lucecitas o borroso.
- Si tienes calentura o escalofríos
- Si tienes sangrado o líquido vaginal
- Si el bebé no se mueve.
- Si tu trabajo de parto se tarda más de 12 horas
- Si tienes ataques o convulsiones
- Si tienes contracciones antes de la fecha probable de parto
- Si tienes molestia o dolor al orinar y/u orinas sangre



Durante el puerperio:

- Dolor de cabeza constante
- Hinchazón de manos, cara piernas y pies
- Ver lucecitas o borroso
- Escuchar zumbidos
- Sangrado vaginal mayor a la menstruación o con mal olor
- Dolor abdominal intenso, como un "cinturón que aprieta"
- Secreción por la herida operatoria y/o enrojecimiento, en caso de cesárea
- Molestias o dolor al orinar



presentas señales de alarma, acude de inmediato a tu unidad de salud para recibir atención médica





Secretario de Salud Pública

Dr. José Luis Alomía Zegarra

Subsecretaria de Servicios de Salud

Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes

Director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades

Dr. Jorge Laureano Eugenio

Directora de Información y Análisis Epidemiológico

Dra. Tanya Rocío Llanes López

Coordinadora de Sistemas de Información Epidemiológica

Dra. María de Jesús Nevares García

