

Informe Epidemiológico mensual Notificación Inmediata de Muerte Materna Sonora, 2024

DICIEMBRE 2024

Definiciones

Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección General de Promoción a la Salud
y Prevención de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Clasificación según el momento de la defunción:

Muerte Materna (MM)

La que ocurre durante el embarazo o hasta 42 días después, independientemente de la duración y el sitio del embarazo; por causas relacionadas con o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales ni incidentales.

Muerte Materna Tardía

La muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días, pero antes de 2 años de la terminación del embarazo.

Clasificación según la causa de defunción:

Defunción Obstétrica Directa

La resultante de complicaciones obstétricas del embarazo, parto o puerperio; intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto, o de acontecimientos derivados de las circunstancias mencionadas.

Defunción Obstétrica Indirecta

La resultante de una enfermedad existente desde antes del embarazo, o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo; no debidas a causas obstétricas directas, pero si agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

Informe Epidemiológico MM, Sonora 2024

Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección General de Promoción a la Salud
y Prevención de Enfermedades
Dirección de Epidemiología


Al mes de diciembre a
nivel nacional se
acumulan a la SE 52

**534
MM**

Sonora registra 15
casos que cuenta para
la RMM.

En México el grupo de
edad con mayor RMM
es el de 45-49 años.

Muertes maternas y Razón de Mortalidad Materna (RMM) en México,
por entidad federativa. A la SE 52, 2024



Informe Epidemiológico MM, Sonora 2024

Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección General de Promoción a la Salud
y Prevención de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

En el mes de diciembre, se
confirmaron:

4

MM*

1

MM tardías

Durante el año 2024
se acumulan:

23

MM ***

- ▶ De acuerdo con los datos de SINAVE** durante el 2023 se acumularon 18 MM, de las cuales 10 contaron para la razón, 6 tardías y 2 de otro estado.
- ▶ Al mes de diciembre del 2023 se acumulaban 18 MM, **10 casos de MM para la RMM, 6 MM tardías y 2 MM de otro estado.**
- ▶ Al mes de diciembre de 2024 se acumulan 23 MM, **15 MM para la RMM, 5 MM tardías, y 3 MM de residentes de otro estado.**
- ▶ La distribución de los casos de MM para el mes de diciembre por municipio es: **Hermosillo (3), Guaymas (1) y defunción en Los Mochis con residencia en Huatabampo (1) .***
- ▶ La distribución de los casos de MM acumulados al 2024 por municipio : **Hermosillo (8), Cajeme (4), Guaymas (4), Agua Prieta (1), Nogales (2), S.L.R.C. (3) y Huatabampo (1).**

*La MM pertenecen a los municipios de: Hermosillo (3), Guaymas (1) y (1) defunción en Los Mochis con residencia en Huatabampo.

** Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

*** MM: Hermosillo (8), Cajeme (4), Guaymas (4), Agua Prieta (1), Nogales (2), S.L.R.C. (3), Los Mochis (1) municipio de residencia: Huatabampo.

Fuente: SSS. DGPROSPE.DIAE. Sistema de vigilancia epidemiológica de notificación inmediata de muertes maternas. A la SE. 52 de 2024.

Causas de mortalidad de MM, Sonora 2024

Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección General de Promoción a la Salud
y Prevención de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Momento de la defunción de MM, 2024

- 2** durante el embarazo (SDG)
- 4** durante el parto (SDG) *
- 4** en las primeras 24 horas posteriores a su evento obstétrico
- 4** entre el 2º y el 10º día posterior a su evento obstétrico
- 2** entre el 11º y 42º día posterior a su evento obstétrico **
- 7** después de los 42 días, pero antes de 1 año de la terminación del embarazo ***

Durante el embarazo o parto: 5

21.73% (5)

Por causas directas: 4

Corioamnionitis
Embarazo ectópico
Hemorragia obstétrica
Eclampsia

Por causas indirectas: 1

Disautonomía cardíaca

Durante el puerperio: 9

39.13% (9)

Por causas directas: 4

Hemorragia postparto
Sepsis puerperal
Acretismo placentario
Choque séptico refractario

Por causas indirectas: 5

Cáncer de mama estadio IV
Cáncer de mama
Fascitis necrotizante
Tuberculosis pulmonar
Tuberculosis miliar

MM tardía: 6

26.08% (6)

Por causas indirectas: 6

Evento Vascular Cerebral Isquémico (2)
Infección de Vías Respiratorias Bajas
Choque hipovolémico
Insuficiencia hepática aguda
Neumonía bacteriana

Otro estado: 3 */**/**

13.04% (3)

Por causas directas: 3

Preeclampsia severa
Retención de placenta
Comunicación interauricular

Informe Epidemiológico MM, Sonora 2024


Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección General de Promoción a la Salud
y Prevención de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Distribución de casos por Distritos de Salud					
DS 1	DS 2	DS 3	DS 4	DS 5	DS 6
8	0	3	8	1*	3
34.78%	0%	13.04%	34.78%	4.34%	13.04%

Al mes de diciembre se acumulan 23 MM para Sonora.

MM por derechohabiencia, Sonora 2024

Distribución de MM



RMM: Razón de Mortalidad Materna.

*La defunción ocurrió en Los Mochis, pero su lugar de residencia era: Huatabampo.

** La defunción en Los Mochis, ocurrió al Hospital General de Los Mochis

Fuente: SSS. DGPROSPE.DIAE. Sistema de vigilancia epidemiológica de notificación inmediata de muertes maternas. A la SE. 52 de 2024.

Recomendaciones Muerte Materna

Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección General de Promoción a la Salud
y Prevención de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Durante el embarazo:

- Ingiera alimentos ricos en calcio, hierro y ácido fólico.
- Evita el ejercicio intenso.
- No cargues cosas pesadas.
- No fumes, bebas alcohol u otras drogas.
- Mantén tu higiene personal y usa ropa cómoda.
- Acude a valoración prenatal, como mínimo 5 consultas.
- Elabora un plan de seguridad para la atención del parto, toma en cuenta: la fecha estimada del nacimiento de tu bebé, el médico que atenderá el parto, las personas que pueden acompañarte y quien te apoyará en el cuidado de tus otros hijos.



Durante el puerperio:

- Continúa la suplementación de ácido fólico (0.4 mg/día).
- Lleva una dieta balanceada.
- Vigila el sangrado vaginal.
- En este periodo es normal que puedas sentir tristeza, se trata de una etapa transitoria llamada “depresión puerperal”. Si este estado de ánimo dificulta tu vida diaria, coméntalo con tu médico.
- Recuerda: después del nacimiento de tu bebé debes acudir a 2 consultas médicas: en los primeros 15 días y al final de tu cuarentena.

Para más información o quejas:



800 M A T E R N A
800 6 2 8 3 7 6 2

Señales de alarma

Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección General de Promoción a la Salud
y Prevención de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Durante el embarazo:

- Si te duele la cabeza.
- Si escuchas zumbidos.
- Si te mareas.
- Si ves lucecitas o borroso.
- Si tienes calentura o escalofríos.
- Si tienes sangrado o líquido vaginal.
- Si el bebé no se mueve.
- Si tu trabajo de parto se tarda más de 12 horas.
- Si tienes ataques o convulsiones.
- Si tienes contracciones antes de la fecha probable de parto.
- Si tienes molestia o dolor al orinar y/u orinas sangre.



Durante el puerperio:

- Dolor de cabeza constante.
- Hinchazón de manos, cara piernas y pies.
- Ver lucecitas o borroso.
- Escuchar zumbidos.
- Sangrado vaginal mayor a la menstruación o con mal olor.
- Dolor abdominal intenso, como un "cinturón que aprieta".
- Secreción por la herida operatoria y/o enrojecimiento, en caso de cesárea.
- Molestias o dolor al orinar.



Si presentas señales de alarma, acude de inmediato a tu unidad de salud para recibir atención médica

Directorio

Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección General de Promoción a la Salud
y Prevención de Enfermedades
Dirección de Epidemiología

Dr. José Luis Alomía Zegarra
Secretario de Salud

Dr. Jorge Laureano Eugenio
Director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades

Dr. Universo Ortiz Arballo
Director de Epidemiología

Dr. Reyna Guadalupe Salcido Corrales
Coordinadora Estatal de Información Epidemiológica